

Röntgenpraxis im SpreeCenter

Drs. med. Heike Grau & Jutta Poser & Uta Bach & Cornelia Heinitz
Fachärzte für Radiologische Diagnostik

Röntgen – MRT – Mammografie – Sonografie – Osteodensitometrie - Computertomografie

Röntgenpraxis im SpreeCenter

12619 Berlin

Hellersdorfer Str. 77

Tel. 030 56 88150 / Fax. 030 56881524

homepage: www.berlin-roentgen.de

mail: anmeldung@berlin-roentgen.de

Ihr Arzt hat Sie zu einer Computertomografie überwiesen.

Das Gerät ist in einem großen Ring installiert, durch den eine Liege mit Ihnen fährt.

Es ist genügend Platz für Ihren Körper. Der Kopf liegt, wenn er nicht selbst untersucht werden soll, außerhalb dieses Ringes. Wichtig ist, dass Sie ruhig liegen und die Atemkommandos, die Sie über einen Lautsprecher hören, beachten.

Für einige Untersuchungen im Bauchbereich bekommen Sie zur besseren Markierung des Darmes ein Kontrastmittel zu trinken. Dieses muss sich über einen ausreichenden Zeitraum im Darm verteilen. Beachten Sie daher eine Dauer der Untersuchung von bis zu 1 bis 2 1/2 Stunden.

Bei einigen Erkrankungen ist es nötig, Gefäße oder Organe noch besser sichtbar zu machen oder ihre Durchblutung zu beurteilen. Dafür bekommen Sie ein wasserlösliches, jodhaltiges Kontrastmittel in eine Armvene gespritzt. Die Entscheidung über die Notwendigkeit wird manchmal erst im Verlauf der Untersuchung gefällt, manchmal aber gleich zu Beginn

Das Kontrastmittel wird fast vollständig über die Nieren ausgeschieden. Darum muss Ihre Nierenfunktion (Kreatinin-Wert) im Normbereich sein.

Die Kontrastmittel, die zugeführt werden, sind zum Teil jodhaltig. Bei einer bestehenden Schilddrüsenüberfunktion ist diese zusätzliche Jodgabe nicht günstig, deshalb ist der TSH - Blutwert notwendig.

Wenn Sie Diabetiker sind und ein metforminhaltiges Medikament einnehmen, melden Sie sich bitte noch einmal umgehend bei uns. Bitte beantworten Sie alle Fragen auf der Rückseite und sprechen Sie uns an, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.

Für diese Kontrastmittelinjektion benötigen wir **2 aktuelle Laborwerte**, die Sie zur Untersuchung bitte mitbringen müssen, das sind der **TSH- Wert und der Kreatinin-Wert, diese Werte dürfen nicht älter als 6 Monate sein!**

Bitte erfragen Sie diese Werte bei Ihrem überweisenden Arzt oder beim Hausarzt.

UNTERSUCHUNGSVORBEREITUNG:

Bitte mindestens 3 Stunden vor der Untersuchung nichts mehr essen, trinken ist erlaubt.

Die Kontrastierung des Darmes und die Verträglichkeit der Kontrastmittel ist besser, wenn der Magen leer und der Darm nicht überfüllt ist, aber bringen Sie ihren Kreislauf nicht durch längeres Hungern oder Dursten in Schwierigkeiten.

Während der intravenösen Kontrastmittelinjektion ist ein Hitzegefühl im Körper, vom Kopf bis zur Blase, normal, welches schnell wieder vorbei geht.

Da wir das Untersuchungsrisiko für Sie so gering wie möglich halten möchten, verwenden wir das modernste Kontrastmittel, bei denen allergische Reaktionen selten sind.

Während der Untersuchung sind wir in Ihrer unmittelbaren Nähe. Bitte teilen Sie uns mit, was sie beunruhigt, insbesondere, wenn Sie folgende Symptome verspüren: Nies- oder Juckreiz, Quaddelbildung, Husten, Atemschwierigkeiten, Schwindel, Übelkeit.

Nach der Kontrastmitteluntersuchung sollten Sie viel trinken, dies fördert die Ausscheidung des Kontrastmittels.

Falls Voraufnahmen oder Befunde vorhanden sind, bringen Sie diese bitte mit !

BITTE BRINGEN SIE EIN GROSSES HANDTUCH MIT !